

ACERTO

Insecticide foliaire pour une vaste gamme de cultures

Composition

18g/l D'Abamectine

EMULSION CONCENTREE (EC)

N° d'homologation



Distribué par :

Fabriqué par :

AGRIPHARMA 2 allée
des villas Ain Sebba
Casablanca

**SHARDA Cropchem
Ltd**

Domnic Holm, 29th Road
Bandra (West),
Mumbai - 400050, India

DANGEREUX

Mode d'action

ACERTO est un insecticide / acaricide de la famille des avermectines, ayant un haut niveau d'efficacité contre les insectes piqueurs et les larves des mouches mineuses ainsi que contre les formes mobiles d'acariens.

L'abamectine pénètre rapidement dans les tissus végétaux après pulvérisation. Sa localisation dans le parenchyme foliaire protège la substance active vis-à-vis des facteurs climatiques (pluies, UV).

La feuille fonctionne comme un réservoir où les acariens qui s'alimentent ingèrent la substance active. Le produit en surface de la feuille et des fruits disparaît après quelques heures de l'application ce qui élimine le danger pour les auxiliaires.

Recommandations d'emploi

Usage		Dose	Nombre d'application	Période	DAR (i)
Melon	Acariens	50 cc/hl	3	-	3
Pommier	Acariens	40cc/hl	1	-	30
Fraisier	Acariens	50 cc/hl	3	En présence de larves et adultes	3
Haricot vert	Acariens	50 cc/hl	3	En présence de larves et adultes	7
Tomate	Acariens	50 cc/hl	3	En présence de larves et adultes	3
Tomate	Mineuse	25 cc/hl	3	En présence de larves et adultes	3
Agrumes	Mineuse des feuilles	25 cc/hl	3	Dès l'apparition des premiers foyers	45
Agrumes	Acariens	40 cc/hl	-	-	45
Courgette	Acariens	50 cc/hl	-	En présence de larves et adultes	3
Courgette	Pucerons	50 cc/hl	-	En présence de larves et adultes	3
Pêcher	Thrips	75 cc/hl	-	En présence du 1 ^{er} individu	30
Poirier	Acariens	40 cc/hl	-	En présence de larves et adultes	30
Poivron	Thrips	75 cc/hl	-	En présence du 1 ^{er} individu	3

Mesures d'emploi

- Ne pas appliquer dans des conditions météorologiques défavorables, ou à l'aide de matériel de pulvérisation, qui pourraient causer une pulvérisation ou une dérive de pulvérisation dans ou sur l'eau.
- La durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer dans la parcelle où a été appliqué le produit est de 24 heures.
- La bouillie doit être pulvérisée sur le feuillage impérativement en début de soirée. Il faut éviter le plein soleil et les heures chaudes de la journée.

Précautions :

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Le manipulateur doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates, casque, etc.).

Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux : Produit irritant.

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec,

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

