

RHYZOSTIM

Stimulateur du développement racinaire sur toutes cultures concentré en acides fulviques de très grande pureté utilisé sur toutes cultures.

RHYZOSTIM est un engrais liquide concentré spécialement étudié pour favoriser le développement racinaire et aérien de toutes les cultures et plus spécifiquement des cultures maraîchères et ornementales.

RHYZOSTIM dispose d'une concentration importante en extraits humiques totaux sous forme exclusivement fulvique.

Ces acides fulviques de par leur poids moléculaire extrêmement faible (environ 300 fois plus petits que les acides humiques) disposent d'une capacité importante à être assimilés et transloqués par la plante, tout en assurant une meilleure assimilation des éléments nutritionnels au niveau du bulbe racinaire et foliaire (pouvoir de complexation des éléments nutritionnels)

Ces acides fulviques interviennent également dans de nombreux processus physiologiques de la plante dont ceux participant activement aux mécanismes complexes de stimulation des elongations racinaires.

RHYZOSTIM grâce à la présence de ces acides fulviques à très faible poids moléculaire et grâce à son pH légèrement acide, pourra être employé soit en applications de type fertigation ou en foliaire sur toutes cultures.

RHYZOSTIM grâce à son complexe fulvique d'une grande pureté d'origine végétale permet de renforcer la résistance des cultures en période de stress de type abiotique (sécheresse, salinité,...)

Composition P/P :

Azote (N) total	5%
Anhydride Phosphorique (P2O5) <small>Soluble eau et citrate ammoniacque</small>	9,00%
Oxyde de Potassium (K2O) <small>soluble eau</small>	5.00%
Polysaccharides	2.0%
Acides fulviques (origine végétale)	7,00%
pH	6.2
Densité	1 250 g/L



Fertirrigation :

CULTURES	DOSES / TRAITEMENT
MARAÎCHAGE ET CULTURES ORNEMENTALES	Le premier mois 2 applications à 5 litres/hectare espacées de 15 jours. Durant le restant du cycle végétatif, appliquer 2 à 3 litres/hectare espacées de 15 jours, et chaque fois que nécessaire.
ARBRES ET ARBUSTES	Après la transplantation, et avant et après floraison, appliquer 3 à 5 litres/hectare, et chaque fois que nécessaire.

Applications foliaires :

CULTURES	DOSES / TRAITEMENT
MARAÎCHAGE ET CULTURES ORNEMENTALES	150 à 200 cc/100 litres d'eau. Nombre de passage : minimum 2 à 15 jours d'intervalle après repiquage et chaque fois que les cultures sont en situation de stress.
CEREALES	1 à 2 Litres/hectare : favorise l'induction du tallage.

